

QUESTIONARIO N. 3

- 1) Quale segno citologico è significativo di flogosi settica:
- reperite batteri nel citoplasma delle cellule infiammatorie
 - reperite cellule infiammatorie intorno a un gruppo di batteri
 - reperite un numero elevato di batteri e cellule infiammatorie.
- 2) Le proteine della fase acuta sono:
- proteine prodotte dal fegato in corso di epatite
 - proteine prodotte dal fegato in corso di processi flogistici
 - citochine prodotte dalle cellule infiammatorie nei processi flogistici
- 3) Quale articolo del Codice Penale dispone che venga punito chi esercita abusivamente una professione?
- art. 348
 - art. 359
 - art. 2229
- 4) Che cosa è la dermatite allergica da contatto?
- la più comune patologia allergica del cane
 - una reazione d'ipersensibilità di tipo IV
 - una rara malattia allergica del gatto
- 5) Il scene refrigerato ha una vita media di circa:
- 15 gg
 - 4 gg
 - 1 gg
- 6) Nella sindrome nefrosica del cane la proteinuria è:
- maggiore di 3 g/l
 - minore di 2 g/l
 - assente
- 7) L'anastomosi è:
- comunicazione tra arterie e capillari
 - comunicazione tra arterie e vene
 - comunicazione tra arterie che portano sangue nella stessa regione
- 8) Che cosa provoca il Warfarin, noto rodenticida?
- interferisce con la normale sintesi epatica dei fattori II, VII, IX e X
 - distrukge i fattori della coagulazione
 - interferisce con la sintesi epatica del fattore VII
- 9) Nella prestazione della garanzia sulla compravendita degli animali il Codice Civile dedica un articolo che stabilisce una gerarchia delle fonti in tema di garanzia. Di quale articolo si tratta?
- 1496
 - 1469
 - 1649
- 10) Qual è il sintomo di una malattia allergica più frequente nel cane?
- asma.
 - prurito.
 - diarrea.
- 11) La classificazione dell'anemia secondo gli indici corpuscolari medi considera:
- MCH e MCHC
 - MCV e MCHC
 - solo MCV
- 12) La malattia di von Willebrand identifica una patologia a carico:
- dell'apparato scheletrico
 - dell'apparato riproduttore
 - della coagulazione del sangue
- 13) La nucleosclerosi del cristallino del cane rappresenta:
- la forma iniziale della cataratta
 - l'alterazione fisiologica della lente dopo i 5-6 anni di vita
 - un sinonimo di cataratta senile
- 14) Le benzodiazepine esercitano i loro effetti sul SNC attraverso la mediazione del neurotrasmettore:
- Acetilcolina
 - Dopamina
 - GABA
- 15) Nell'esecuzione della prestazione professionale, in rapporto alla natura dell'attività specifica dedotta nell'obbligazione, deve essere valutata:
- la prudenza
 - la diligenza
 - la perizia
- 16) La modalità di trasmissione più comune della degenerazione retinica ereditaria del cane è quella:
- Autosomica dominante
 - Autosomica recessiva
 - X-linked
- 17) I piretroidi sono controindicati nei:
- gatto
 - cane
 - cavallo
- 18) L'azione antemetica della metoclopramide è legata a:
- inibizione di ricettori H1 nel centro del vomito
 - inibizione di ricettori 5HT nel centro del vomito
 - inibizione di ricettori DA nella CTZ

- 19) La sindrome Wobbler, o spondilopatia cervicale caudale, può colpire:
- solo gli Alani
 - solo i Dobermann
 - molte razze
- 20) La trichiasi del canto mediale del cane è una patologia oculare tipica delle razze:
- mesocefale
 - dolicocefale
 - brachicefale
- 21) La neoplasia renale primaria più frequente nel gatto è:
- carcinoma delle cellule di transizione
 - carcinoma delle cellule renali
 - linfoma
- 22) Il PTH è:
- una proteina sintetizzata e secreta dalla paratiroide
 - una proteina sintetizzata e secreta dall'ipofisi
 - una proteina sintetizzata e secreta dall'ipotalamo
- 23) Le alterazioni ematologiche più frequenti in corso di epatopatia sono:
- neutropenia e linfopenia
 - anemia moderata
 - relative a morfologia e volume eritrocitario
- 24) Il farmaco di elezione nell'Ehrlichiosi canina è:
- doxiciclina
 - imidocarb
 - idrostreptomicina
- 25) L'ernia iatale del cane, nella maggior parte dei casi è:
- a seguito di un'elevata pressione addominale positiva
 - congenita
 - una complicanza del tetano
- 26) Nell'insufficienza epatica acuta
- è molto difficile identificare una causa specifica
 - è colpita una limitata porzione epatica ma in modo improvviso
 - è sempre necessario un intervento chirurgico
- 27) Il peritoneo è:
- una struttura parietale, viscerale e diaframmatica
 - una membrana sierosa composta di cellule mesoteliali
 - un legamento che collega gli organi addominali
- 28) Nel trattamento delle infezioni urinarie ricorrenti è consigliabile:
- usare un antibiotico ad ampio spettro
 - scegliere l'antibiotico sulla base dell'antibiogramma
 - evitare l'uso degli antibiotici per evitare fenomeni di resistenza
- 29) L'omocedesi è:
- la malformazione dell'unghia
 - un'anomala ipertrofia e incurvamento delle unghie
 - il distacco dell'unghia dal letto ungueale
- 30) È possibile riscontrare un polso debole in caso di:
- eccitazione o paura
 - cardiomiopatia dilatativa
 - fibрилazione atriale
- 31) In un radiogramma toracico i linfonodi:
- non sono normalmente visibili in un animale sano
 - sono sempre evidenti ma di piccole dimensioni
 - sono evidenziali solo con mezzo di contrasto
- 32) Quanti sono i margini del polmone:
- 2: dorsale, caudale
 - 2: dorsale, ventrale
 - 3: dorsale, ventrale, caudale
- 33) Che cosa sono le cellule del Sertoli:
- cellule che producono gli spermatozoi
 - cellule che producono il testosterone
 - cellule colonnari che formano una rete entro cui si organizza l'epitelio seminifero
- 34) La qualità radiografica dipende da:
- densità – contrasto – dettaglio;
 - densità – contrasto – distanza fuoco pellicola;
 - densità – abbinamento – schermo pellicola.
- 35) Un buon contrasto addominale si ha:
- nel cane inferiore a 3 mesi di età
 - nel gatto
 - nel cane sovrappeso